

УДК 616.31-071.1-082(075.8)

Ахмедов Собиржон Астанакулович

ассистент кафедры пропедевтической стоматологии
Андижанский Государственный Медицинский Институт
Андижан, Узбекистан.

**АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РЕЦЕССИЙ ДЕСЕН СРЕДИ
ПАЦИЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.**

АННОТАЦИЯ

Несмотря на то, что теоретические и практические исследования в области стоматологии ведутся уже давно, сегодня проблема профилактики и лечения заболеваний тканей пародонта считается очень актуальной.

Ключевые слова: рецессия десны, реставрация, мягкие ткани.

Akhmedov Sobirzhon Astanakulovich

Assistant at the Department of Propaedeutic Dentistry
Andijan State Medical Institute
Andijan, Uzbekistan.

**ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF GUM RECESSIONS AMONG
DENTAL PATIENTS OF VARIOUS AGE GROUPS.**

ANNOTATION

Despite the fact that theoretical and practical studies in the field of Dentistry have been conducted for a long time today, the problem of prevention and treatment of diseases of periodontal tissues is considered very urgent.

Keywords: gum recession, restoration, soft tissues.

Введение. В сегодняшних условиях проблема профилактики и лечения заболеваний тканей пародонта чрезвычайно актуальна, несмотря на то, что в течение длительного времени проводятся как теоретические так и прикладные исследования в этой области стоматологии. Высокая распространенность заболеваний тканей пародонта у населения разнообразие их этиологических факторов, клинических проявлений, недостаточная эффективность первичной и вторичной профилактики заболеваний у молодых людей (возрастом 18-25 лет) на сегодняшний день является одной из важнейших проблем современной стоматологии.

Одной из актуальных проблем современной пародонтальной хирургии является лечение десневых рецессий, появление которых ставит под угрозу качество стоматологического лечения. По данным Петрушанко А. М., распространенность рецессии десен колеблется от 9,7 % – у молодежи и до 99,3 % – у взрослого населения. При этом авторы отмечают, что с возрастом распространенность и интенсивность рецессии десен растет. По данным отдельных эпидемиологических исследований распространенность патологии рецессии десен колеблется в пределах 40–90% .

Согласно данным Kassab M.M. и Cohen R.E. (2003) более 50% людей в возрасте от 18 до 64 лет имеют клинические признаки одной из форм рецессии десен, а распространенность данной патологии среди населения старшего возраста (старше 65 лет) превышает 88%. Чаще рецессия ясенного края локализуется с вестибулярной поверхности в участке верхних клыков и премоляров, а также нижних клыков и резцов; реже – с вестибулярной или оральной поверхности верхних моляров. Показатель рецессии десен у людей 21-30 лет в среднем составляет 0,37 мм на верхней челюсти и 0,71 мм на нижней челюсти; у людей 31-40 лет соответственно 1,1 мм и 1,5 мм; 41-50 лет – 1,98 мм и 2,05 мм; 51- 60 лет – 1,11 мм и 2,98 мм .

Согласно данным ряда авторов в возрастной группе от 18 до 25 лет основными этиологическими факторами рецессий десен являются анатомические особенности, такие, как макроденция и вестибулярное прорезывание зуба, а также ранее проведенное ортодонтическое лечение, связанное с расширением зубного ряда и перемещением зубов в вестибулярном направлении.

В возрасте от 26 до 45 лет рецессия десен развивается как следствие воспалительных заболеваний пародонта, интенсивность которых обусловлена анатомическими особенностями индивидуума. Пациенты старше 46 лет склонны к рецессии десен почти в 100% случаев (от 46-59 лет – 97,4%, от 60 лет – 100%).

Цель работы провести анализ распространенности рецессий десен среди стоматологических пациентов всех возрастов и факторов, способствующих их развитию.

Материалы и методы исследования.

В ходе работы были соблюдены общие этические правила гуманного отношения к пациентам в соответствии с требованиями Токийской декларации Всемирной медицинской ассоциации и международных рекомендаций Хельсинкской декларации прав человека. Для исследования было обследовано 1000 пациентов, которым проводился клинический осмотр с целью идентификации признаков дефицита мягких тканей в области собственных зубов и стоматологических реставраций в форме рецессии десен. Из осмотренных 1000 пациентов, распределение таковых по критерию возраста было представлено следующим образом: до 20 лет – 153 человека (15,30%), 20-29 лет – 184 человека (18,40%), 30-39 лет – 195 человек (19,50%), 40-49 лет – 187 человек (18,70%), 50-59 лет – 169 человек (16,90%), 60 и более лет – 112 человек (11,20%).

Результаты в результате проведенного исследования установлено, что у 841 пациента было диагностировано наличие рецессии десен различной степени

тяжести согласно используемым диагностическим критериям, рекомендованным ICD-9-СМ и American Academy of Periodontology. Из 153 пациентов возрастной категории до 20 лет признаки рецессии десен были идентифицированы у 75 человек (49,02%), из 184 пациентов возрастной категории 20-29 лет – у 123 человек (66,85%), из 195 пациентов возрастной категории 30- 39 лет – у 189 человек (96,92%), из 187 пациентов возрастной категории 40-49 лет – у 181 человек (96,79%), из 169 пациентов возрастной категории 50-59 лет – у 165 человек (97,63) %), из 112 пациентов возрастной категории 60 и более лет – у 108 человек (96,43%). Среднеарифметический уровень распространенности рецессий среди

пациентов разных возрастных категорий достигал $83,94 \pm 17,34\%$. Среди пациентов с диагностированными рецессиями возрастная категория до 20 лет была представлена 45 лицами мужского пола (60%) и 30 лицами женского пола (40,0%), возрастная категория 20-29 лет – 74 лицами мужского пола (60,16%) и 49 лицами женского пола (39,84%), возрастная категория 30-39 лет – 112 лицами мужского пола (59,26%) и 77 лицами женского пола (40,74%), возрастная категория 40-49 лет – 126 лицами мужского) пола (69,61%) и 55 лицами женского пола (30,39%), возрастная категория 50-59 лет – 108 лицами мужского пола (65,25%) и 57 лицами женского пола (34,55%), и возрастная категория пациентов 60 и более лет – 74 лицами мужского пола (68,52%) и 34 лицами женского пола (31,48%).

Выводы в результате проведенного исследования установлены средние уровни распространенности рецессий десен среди пациентов разных возрастных подгрупп, которые составляли 49,02% среди пациентов в возрасте до 20 лет, 66,85% среди пациентов в возрасте 20-29 лет, 96,92% среди пациентов возрастной категории 30-39 лет, 96,79% среди пациентов возрастной категории 40-49 лет, 97,63% среди пациентов возрастной категории 50-59 лет и 96,43%

среди пациентов возрастной категории 60 и более лет. В ходе обработки полученных результатов удалось констатировать рост среднего уровня распространенности рецессий десен при росте среднего показателя возраста, а также превалирование рецессий среди пациентов мужского пола.

Список литературы

1. Аветиков ДС, Яценко ИС, Локес КП, Ставицкий СО, Каплун ДВ. Современные подходы к хирургическому лечению рецессии десен. Вестник проблем биологии и медицины. 2015;2(119):9-
2. Петрушанко АМ. Методика профилактики и комплексного лечения воспаления и рецессии десен. Фитотерапия. 2014; 4: 24-7.
4. З.К.Хакимова «Анализ микробиологии полости рта у пациентов после реставрации твёрдых тканей зуба». JOURNAL OF IQRO, Volume9, issue1, 2024
5. Z.Q. Hakimova “The use of botulinum toxin in dental practice” -Eurasian medical research periodical.- Volemi 14. November 2022.
6. З.К.Хакимова, Х.Х. Исамжонов «Цитакиновый статус привторичных и остаточных дефектах нёба после уранопластики у детей при местных и патогенетических изменениях»-Journal of modern edicine., №3(6), 2024